

Elektrolysen von Mischungen fettsaurer Salze mit Nitrat

Verkürzte Fassung der
Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde vorgelegt der
Mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung der Philoso-
phischen Fakultät der Universität Basel

von

Fritz Metz
aus Basel

BASEL
Buchdruckerei E. Birkhäuser & Cie., A. G.
1936

Elektrolysen von Mischungen fettsaurer Salze mit Nitrat

Verkürzte Fassung der Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde vorgelegt der
Mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung der Philoso-
phischen Fakultät der Universität Basel

von

Fritz Metz
aus Basel

BASEL
Buchdruckerei E. Birkhäuser & Cie., A. G.
1936

Genehmigt von der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Abteilung der philosophischen Fakultät auf Antrag der Herren
Professoren Dr. *Fr. Fichter* und Dr. *H. Rupe*.

Basel, den 26. Mai 1936.

Prof. Dr. *A. L. Bernoulli*,
Dekan.



Herrn *Fritz Metz* wurde von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung der philosophischen Fakultät der Universität Basel am 26. Mai 1936 erlaubt, diese verkürzte Fassung seiner Inauguraldissertation drucken zu lassen. Die vollinhaltliche Arbeit mit dem Titel:

Elektrolysen von Mischungen fettsaurer Salze mit Nitrat
kann eingesehen oder entliehen werden:

1. im Chemischen Institut (Anorganische Anstalt) der Universität Basel;
2. in der Universitätsbibliothek Basel;
3. in der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern.

Erklärung von Alfred Arndt über seine

Lebensgeschichte

MEINEN LIEBEN ELTERN IN DANKBARKEIT

Alfred Arndt, geboren am 1. März 1871 in Berlin

Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt mit großer Freude und dankbarer Erinnerung an meine Eltern, die mich zu dem, was ich heute bin, erzogen haben, an diese meine Lebensgeschichte geschrieben. Ich habe mich bemüht, die Ereignisse meines Lebens so genau wie möglich festzuhalten, um mich selbst und meine Eltern über meine Entwicklung zu informieren. Ich habe mich bemüht, die Ereignisse meines Lebens so genau wie möglich festzuhalten, um mich selbst und meine Eltern über meine Entwicklung zu informieren.

Ich habe mich bemüht, die Ereignisse meines Lebens so genau wie möglich festzuhalten, um mich selbst und meine Eltern über meine Entwicklung zu informieren. Ich habe mich bemüht, die Ereignisse meines Lebens so genau wie möglich festzuhalten, um mich selbst und meine Eltern über meine Entwicklung zu informieren.

Ich habe mich bemüht, die Ereignisse meines Lebens so genau wie möglich festzuhalten, um mich selbst und meine Eltern über meine Entwicklung zu informieren. Ich habe mich bemüht, die Ereignisse meines Lebens so genau wie möglich festzuhalten, um mich selbst und meine Eltern über meine Entwicklung zu informieren.

Elektrolyse von Nitrat-Acetat-Gemischen.

1. Einleitung.

Im Anschluss an die Untersuchungen über die Elektrolyse von Mischungen von Propionaten und Nitraten¹⁾ prüften wir das Verhalten einer Mischung von Acetaten und Nitraten an der Anode, und erhielten Methyl-nitrat, ganz analog, wie aus dem Propionat-Nitrat-Gemisch Äthyl-nitrat entstanden war. Wir fanden keine dem Äthylenglykol-dinitrat, dem n-Butyl-nitrat oder dem Tetramethylenglykol-dinitrat entsprechenden Stoffe. Dafür trat aber als neuartiges Elektrolysenprodukt Nitromethan auf, ein Nitrokörper der Fettreihe, womit das Ziel, das sich W. v. Miller und Hans Hofer²⁾ seinerzeit bei der Elektrolyse von Mischungen von Propionat und Nitrit gesteckt hatten, erreicht worden ist. Für die Aufklärung des verwickelten Reaktionsverlaufs bei den Propionat-Nitrat-Gemischen, die wir unter anderem von der Heranziehung der Essigsäure erhofft hatten, haben diese Versuche somit nichts beigetragen. Dagegen ist mit der Bildung des Nitromethans ein neues Problem aufgetaucht.

2. Elektrolyse von Nitrat-Acetat-Gemischen.

Auf Grund von Vorversuchen hat sich folgende Anordnung als geeignet herausgestellt. Der Elektrolysierapparat baut sich auf aus einer Tonzelle als Anodenraum, mit einem Platinblech von 54 cm² Gesamtoberfläche; in die Zelle kommen 160 cm³ einer Mischung aus gleichen Volumina kaltgesättigter Natriumacetatlösung (1260 g NaC₂H₃O₂ + 3 H₂O im Liter = 9,26-n.) und 3,5-n. Natriumnitratlösung, wozu 40 cm³ Eisessig gesetzt werden. Die Anodenflüssigkeit (200 cm³) ist also ca. 3,7-n. an Natriumacetat, ca. 1,4-n. an Natriumnitrat und ca. 3,2-n. an Essigsäure. Im Kathodenraum steht eine Kupferkathode in 2-n. Natriumacetatlösung, welche letztere nach jeder Elektrolyse erneuert werden muss, weil sie stark alkalisch wird. Die Stromstärke beträgt 7 Amp., die anodische Stromdichte 0,130 Amp./cm². Nach dem Durchsenden von 14 Amp.-Stunden ist der Anolyt schwach gelb gefärbt und riecht süßlich-ätherisch; beim Erhitzen der Lösung geht mit den ersten Anteilen des Destillats ein Öl über, das sich unter dem Wasser ansammelt und dessen Volumen bei jedem Versuch etwa 1,8 cm³ ausmacht.

Das in einer Versuchsreihe angesammelte Rohöl, etwa 155 g, wurde durch Schütteln mit Natriumbicarbonatlösung von Essigsäure befreit, über wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet, und das so gereinigte Öl (140 g) der fraktionierten Destillation an einer Widmer-Kolonne unterworfen, wobei zuerst im Wasserbad erhitzt wurde:

¹⁾ Fr. Fichter, Walter Siegrist und Hans Buess, *Helv.* **18**, 18 (1935).

²⁾ B. **28**, 2430, 2437 (1895).

1) Sdp. 58—62°, 2,5 g; 2) Sdp. 62—64°, 3,0 g; 3) 64—68°, 104 g; 4) 68—70°, 10 g; 5) 70—72°, 7,5 g; 6) bei Wasserbadtemperatur nicht flüchtig, 11,5 g.

Nach zweimal wiederholter langsamer Fraktionierung erhielten wir zwei Hauptfraktionen, A, 111,5 g vom Sdp. 64—66° (Methylnitrat), und B, 8,5 g vom Sdp._{730 mm} 100—101° (Nitromethan).

3. Methyl-nitrat.

Die Fraktion A zeigte wohl den Siedepunkt des Methyl-nitrats¹⁾, doch entsprach die Dichte d_{20}^{190} 1,1622 nicht ganz den Literaturangaben (1,2167 bei 15°, 1,2032 bei 25°¹⁾).

Es lag darum die Vermutung nahe, bei der Elektrolyse sei trotz der Anwesenheit freier Essigsäure nach der Reaktion von *J. Hofer* und *W. Moest*²⁾ Methylalkohol entstanden, dessen Sdp._{760 mm} 64,56°³⁾ mit dem des Methyl-nitrats zusammenfällt, während das spez. Gew. bei 15° nur 0,79647 beträgt. Allein das Ausschütteln mit Wasser oder die Behandlung mit geschmolzenem Calciumchlorid verbesserte das spezifische Gewicht nicht.

So kamen wir zum Schluss, dem Methyl-nitrat sei ein gewisser Anteil der zweiten Fraktion, des Nitromethans, beigemengt, dessen spez. Gew. bei 20° 1,1382 beträgt. In der Tat liess sich Nitromethan in der Fraktion A qualitativ nach *C. D. Manzoff*⁴⁾ durch die Rotfärbung beim Erwärmen mit Ammoniak und einer Spur Vanillin nachweisen. Um es zu entfernen, wurde die Fraktion A sechsmal mit je 20 cm³ 2-n. Natronlauge durchgeschüttelt, bis dass die alkalische Schicht keine Nitrolsäure-Reaktion mehr gab, zum Schluss mit Wasser gewaschen und mit Calciumchlorid getrocknet. Das so gereinigte Methyl-nitrat siedete nun bei 64,5—65° (740 mm) und zeigte d_{20}^{230} 1,2059; es besass alle Eigenschaften dieser Verbindung, explodierte beim Überhitzen der Dämpfe, und gab mit *Devarda*'scher Legierung Ammoniak.

0,1207; 0,0846 g Subst. gaben im Nitrometer 39,0; 27,5 cm³ NO (21°, 735 mm; 22°, 735 mm) 0,1783; 0,2943 g Subst. gaben 0,5307; 0,8910 g AgJ (*Zeisel*).

CH ₃ O ₃ N	Ber. N 18,18	O·CH ₃ 40,27%
	Gef. „ 18,15; 18,20	„ 39,32; 39,99%

4. Nitromethan.

Die Fraktion B zeigte sämtliche Eigenschaften des Nitromethans; Sdp._{730 mm} 100—101°; d_{20}^{230} 1,1356⁵⁾; die wässrige Lösung reagiert schwach sauer. Verdünnte Natronlauge löst das Öl auf; die Rotfärbung nach *Manzoff* (s. o.) ist intensiv.

4,330; 4,205 mg Subst. gaben 3,245; 3,160 mg CO₂ und 1,840; 1,800 mg H₂O⁶⁾ 4,880; 3,570 mg Subst. gaben 0,9114; 0,6643 cm³ N₂ (23°, 708 mm; 23°, 706 mm⁷⁾)

CH ₃ O ₂ N	Ber. C 19,66	H 4,95	N 22,95%
	Gef. „ 20,43; 20,49	„ 4,75; 4,79	„ 20,13; 19,93%

¹⁾ *Perkin*, Soc. **55**, 682 (1889), Sdp. 65° (korr.).

²⁾ A. **323**, 284 (1902).

⁴⁾ *Z. Nahr. Genussm.* **27**, 469 (1914).

³⁾ *J. Gyr*, B. **41**, 4326 (1908).

⁵⁾ *Perkin*, Soc. **55**, 687 (1889), d_{25}^{250} 1,1330.

⁶⁾ Kohlenstoff- und Wasserstoffbestimmung im Stickstoffstrom.

⁷⁾ Stickstoffbestimmung unter Zusatz von chemisch reinem Naphtalin.

Die Mikroanalysen befriedigen nicht ganz; trotzdem dürfte nach Analyse und Reaktionen von Fraktion B kein Zweifel obwalten, dass Nitromethan vorliegt, dem vielleicht ein kohlenstoffreicherer Begleiter beigemengt ist¹⁾. Durch *Devarda'sche* Legierung wurde das Nitromethan in alkalischer Lösung zu Methylamin reduziert, das abdestilliert und durch Einleiten der Dämpfe in eine Lösung von Pikrinsäure in Essigester in das Pikrat verwandelt wurde. Dasselbe zeigte nach dem Umkrystallisieren den Smp. 210°²⁾.

4,520; 4,490 mg Subst. gaben 5,405; 5,355 mg CO₂ und 1,355; 1,315 mg H₂O
4,700; 4,270 mg Subst. gaben 0,9237; 0,8428 cm³ N₂ (21°, 716 mm; 22°, 716 mm)


C₇H₈O₇N₄ Ber. C 32,30 H 3,10 N 21,54%
Gef. „ 32,60; 32,52 „ 3,28; 3,27 „ 21,50; 21,52%

5. Besprechung der Ergebnisse.

Die Bildung von Methyl-nitrat als Hauptprodukt der Elektrolyse einer Acetat-Nitrat-Mischung entspricht vollkommen der Bildung von Äthyl-nitrat bei der analogen Elektrolyse einer Mischung von Propionat und Nitrat, und ist auch analog zu erklären, indem der auf dem Wege über Di-acetyl-peroxyd und Acet-persäure entstehende Methylalkohol mit Salpetersäure verestert wird. Diese Bildungsweise wurde vor kurzem³⁾ beim Propionat durch die Reaktion zwischen Di-propionyl-peroxyd und Salpetersäure chemisch paralleliert. Für die Annahme, dass bei der Acetat-Nitrat-Elektrolyse intermediär Methylalkohol auftritt, spricht der bei der Aufarbeitung beobachtete Geruch nach Formaldehyd.

Wir fanden bis jetzt bei der Acetat-Nitrat-Elektrolyse keine synthetischen Produkte; man hätte in Analogie mit der Propionat-Nitrat-Elektrolyse Äthyl-nitrat und Äthylenglykol-dinitrat erwarten dürfen.

Die Bildung des Nitromethans, von dem ungefähr $\frac{1}{7}$ bis $\frac{1}{10}$ soviel entsteht wie von Methyl-nitrat, ist schwerer zu erklären. Eine Bruttogleichung



zeigt, dass kein Oxydationsvorgang vorliegt. Die Entladung von CH₃·COO' und NO₃' kann aber auch nicht zu CH₃·NO₂ führen. Die Rolle des elektrischen Stroms bei dieser Reaktion ist nicht durchsichtig⁴⁾. Man muss vielleicht annehmen, es bilde sich zunächst aus Essigsäure und Salpetersäure unter dem irgendwie aktivierenden Einfluss der Anode Nitro-essigsäure und diese zerfalle in bekannter Weise in Nitromethan und Kohlendioxyd. Zur Prüfung einer derartigen Hypothese werden wir weitere Versuche anstellen.

¹⁾ darauf deutet auch eine allerdings nur einmal gemachte Beobachtung eines höher, bei 280° schmelzenden Pikrats aus dem Reduktionsprodukt.

²⁾ Die Literaturangaben über den Schmelzpunkt des Methylamin-pikrats widersprechen sich: Smp. 207°, *Delépine*, Ann. chim. [7] **8**, 461 (1896); Smp. 215° *Ristenpart*, B. **29**, 2530 (1896).

³⁾ *Fr. Fichter* und *Hans Buess*, Helv. **18**, 549 (1935).

⁴⁾ Vgl. die Bildung von Nitro-äthan aus Di-propionyl-peroxyd und Salpetersäure, Helv. **18**, 552 (1935).

Elektrolyse von Mischungen von n-Butyraten mit Nitraten.

1. Einleitung.

In weiterer Verfolgung der durch Elektrolyse von Gemischen fettsaurer Salze mit Nitraten erzielten Synthesen¹⁾ unterwarfen wir die n-Buttersäure dieser Reaktion, und haben dabei eine frühere Schlussfolgerung bestätigt gefunden, dass nämlich die Bildung von Alkoholen bzw. der entsprechenden ungesättigten Kohlenwasserstoffe ein wichtiges Glied in der Reihe der Reaktionen vorstellt. Darum verhalten sich die Acetate so verschieden von den Propionaten, weil bei den ersteren wohl Methylalkohol, aber kein ungesättigter Kohlenwasserstoff in irgend beträchtlicher Menge auftritt, während bei den letzteren die Äthylenbildung die Hauptreaktion ausmacht.

Es ist nun auch gelungen, die Bildung eines Nitrokohlenwasserstoffs, des Nitropropans, in kleiner Menge nachzuweisen, während die Isolierung des Nitroäthans aus der Propionat-Nitrat-Elektrolyse nicht geglückt war. Die Entstehung der Nitrokörper, die bei der Elektrolyse von Nitrat-Acetat-Gemischen zu einer ansehnlichen Ausbeute an Nitromethan führt, erfolgt offenbar auf Grund einer anderen Reaktionsweise der Salpetersäure als die Bildung der Alkyl-nitrate und Alken-dinitrate.

2. Die Elektrolyse.

Zur Elektrolyse diente ein Apparat mit zwei ineinander gesteckten Tondiaphragmen. Das innerste derselben enthielt 150 cm³ Anolyt, der aus einer Lösung von 352 g n-Buttersäure, 160 g Natriumhydroxyd und 170 g Natriumnitrat im Liter hergestellt und in Bezug auf Butyrat 4-n., in Bezug auf Nitrat 2-n. war. Den 150 cm³ Anolyt wurden 20 g Kaliumbicarbonat zugesetzt, um das Sauerwerden der Lösung und damit die Ausscheidung von Buttersäure zu verhindern. Im Anodenraum hingen 2 Platinblechanoden mit je 12 cm² einseitiger Oberfläche; ausserdem sorgte eine wasserdurchflossene Glasrohrschlange für Kühlung, und ein Glasrührer für dauernde Durchmischung. Der Zwischenraum zwischen den beiden Tonzellen war beschickt mit 200 cm³ einer Mischung von Natriumnitrat und Natriumcarbonat, die an beiden Salzen 2-n. war. Im äussersten Raum befand sich 2-n. Natriumcarbonatlösung, in welcher eine kupferne Kühlschlange als Kathode stand. Die Stromstärke betrug 4 Amp., die anodische Stromdichte 0,166 Amp./cm², die Temperatur im Anodenraum 18–20°.

Am Schluss der Elektrolyse, nach dem Durchsenden von 30 Amp.-Std., wurde die Ölschicht im Anodenraum abgehoben und durch Schütteln mit Kaliumbicarbonatlösung von Buttersäure befreit. Die Ausbeute an neutralem Rohöl erreichte 24 g nach 30 Amp.-Std.; dazu kommt noch ca. 1 g Rohöl, das dem alkalischen Elektrolyten durch

¹⁾ Helv. 18, 18, 549, 1005 (1935).

Äther entzogen wird. Von den 52.8 g Buttersäure, die in 150 cm³ Anolyt stecken, ist annäherungsweise die Hälfte noch vorhanden.

Bei der Rückgewinnung der Buttersäure stellte es sich heraus, dass die Säure, deren Reinheit vor der Verwendung kontrolliert worden war, niedriger siedende Anteile enthielt. Mit Hilfe der von *Haberland*¹⁾ beschriebenen Methode der Abscheidung als basisches Bleisalz liess sich aus dem durch fraktionierte Destillation an der *Widmer*-Kolonne erhaltenen Säuregemisch Propionsäure (2,5 g) vom Sdp._{740 mm} 138—140° abtrennen.

0,5703 g Subst. verbrauchten 15,4 cm³ 0,5-n. NaOH

C₃H₆O₂ Äquiv.-Gew. Ber. 74,047 Gef. 74,07

Die nicht als basisches Bleisalz fällbare Fraktion vom Sdp._{735 mm} 116—118° war Essigsäure (1,5 g).

0,7483 g Subst. verbrauchten 25,0 cm³ 0,5-n. NaOH

C₂H₄O₂ Äquiv.-Gew. Ber. 60,03 Gef. 59,86

Die Bildung der beiden niedrigen Homologen beweist, dass an der Anode bei Gegenwart der Nitrate unter anderem ein oxydativer Abbau der Buttersäure stattfindet. Es wurde bereits bei früheren Gelegenheiten²⁾ gezeigt, dass Salpetersäure im Anodenraum die oxydative Zerstörung der organischen Verbindungen befördert.

3. Die fraktionierte Destillation des Rohöls.

Wir hatten bei der Untersuchung des aus den Propionat-Nitrat-Elektrolysen entstandenen Estergemisches die Erfahrung gemacht, dass eine Trennung durch fraktionierte Destillation nur unvollkommen gelingt; die wiederholte Destillation ist auch nicht gefahrlos, weil die organischen Nitrate bei höherer Temperatur explodieren. Ohne uns einer Täuschung hinzugeben über die Wirksamkeit einer derartigen Trennung haben wir doch das Rohöl einer gründlichen Fraktionierung unterworfen, wobei durch Wahl des Drucks dafür gesorgt wurde, dass die Siedetemperatur nie über 135° stieg. Bei den niedrig siedenden Anteilen wurde durch wirksame Kühlung der Vorlagen mit Kältemischungen die Verluste möglichst vermieden. Die einzelnen Fraktionen wurden qualitativ auf Nitrokörper und im *Lunge*'schen Nitrometer auf Salpetersäure-ester geprüft, und schliesslich durch Reduktions- und Verseifungsversuche ihre Zusammensetzung ermittelt. Die vorgängige fraktionierte Destillation ist aber unentbehrlich, um die zahlreichen Stoffe in einige Hauptanteile zu scheiden.

Bei einer ersten Aufarbeitung wurden 15 Fraktionen getrennt, beginnend mit einem Sdp. ca. 50° bei gewöhnlichem Druck, bis hinauf zum Sdp._{3 mm} 117—120°; der nitrometrisch ermittelte Stickstoffgehalt betrug im Minimum 0,42% (Sdp. 137—140°), im Maximum 9,99% (Sdp._{3 mm} 117—120°); primäre Nitrokörper waren in den niedersten Fraktionen vertreten, am stärksten bei der vom Sdp. 128—131°.

Bei einer späteren Bearbeitung von ca. 300 g Rohöl wurde die Zahl der Fraktionen vermindert auf sieben, nämlich: I. Sdp._{750 mm} 50—60°, 38 g; II. Sdp._{750 mm} 102—114°, 48 g; III. Sdp._{750 mm} 114—130°, 56 g; IV. Sdp._{100 mm} 90—115°, 68 g; V. Sdp._{12 mm} 93—105°, 39 g; VI. Sdp._{6 mm} 105—120°, 25 g; VII. Rückstand, 26 g.

¹⁾ Z. anal. Ch. **38**, 218 (1899).

²⁾ *Fr. Fichter und Gérald Bonhôte*, *Helv.* **3**, 401 (1920); *Fr. Fichter und Ernst Plüss*, *Helv.* **15**, 241 (1932).

4. Der Nitrokörper.

Um ihn zu isolieren, wurde das Rohöl nach Abtrennung der niedrigst siedenden Fraktion mit 2-n. Natronlauge in der Kälte durchgeschüttelt und das aus der gelbbraunen alkalischen Lösung durch Wiederansäuern gewonnene Öl (wenige Tropfen) mit Zinkstaub in schwefelsaurer Lösung reduziert. Nach dem Versetzen mit überschüssiger 50-proz. Natronlauge wurde das entstandene Basengemisch mit Wasserdampf übergetrieben und in Salzsäure aufgefangen. Die eingedampfte Lösung gab neben Ammoniumchlorid das in Alkohol lösliche und zerfließende Chlorid einer organischen Base, das nach wiederholtem Umlösen sich durch seinen Smp. 150—155° und durch seinen Chlorgehalt als n-Propylammoniumchlorid erwies (Schmelzpunkt des n-Propylammoniumchlorids 157—158°, *Curtius* und *Göbel*¹⁾).

0,0296 g verbrauchten nach *Mohr* 3,25 cm³ 0,1-n. AgNO₃
C₃H₁₀NCl Ber. Cl 37,11 Gef. Cl 38,9%

Da der Nitrokörper die Reaktionen primärer Nitrokörper zeigte, so kann es sich nur um α-Nitropropan, CH₃—CH₂—CH₂NO₂ und um n-Propylammoniumchlorid handeln; der Schmelzpunkt des Chlorids ist nicht beweisend, da Isopropylammoniumchlorid fast gleich hoch schmilzt, 153—155°, *Skraup* und *Wiegmann*²⁾).

5. n-Hexan (Fraktion I).

Ungehindert durch das Natriumnitrat verläuft bei der Elektrolyse des n-Butyrat-Nitrat-Gemisches an einem kleinen Teil des Butyrats die *Kolbe'sche* Kohlenwasserstoffsynthese, deren Produkt, das n-Hexan, sich in der niedersten Fraktion vom Sdp. 50—60° findet, neben Isopropyl-nitrat. Zur Reinigung wurde die Fraktion mit konz. Schwefelsäure unter häufigem Schütteln am Rückfluss erwärmt; das unverändert gebliebene Öl, 4 g aus 320 g Rohöl, war nun stickstofffrei, ging von 68—69° über, und zeigte das spez. Gew. d₁₉^{19°} 0,6616 (n-Hexan, Sdp. 744 mm 68,4—68,8°, d₄^{20°} 0,6603, *Brühl*³⁾).

0,2638 g Subst. gaben nach *V. Meyer* 73,5 cm³ Dampf (18°, 745 mm)
C₆H₁₄ Mol.-Gew. Ber. 86,109 Gef. 90,1

6. Fraktion II.

Sdp. 745 mm 102—114°; d₁₉^{19°} 0,9966

0,1953 g Subst. gaben im Nitrometer 17,0 cm³ NO (20°, 745 mm)
Gef. N 4,97%.

Die Fraktion ist ein Gemisch von Isopropyl-n-butyrat und Isopropyl-nitrat. 48 g der Substanz wurden mit Zinkstaub und Schwefelsäure am Rückflusskühler reduziert und dann mit Wasserdampf destilliert. Aus dem Destillat schieden sich 7 g unverseiftes Isopropyl-n-butyrat ab; Sdp. 750 mm 127—128°; d₂₀^{20°} 0,8565. *Silva*⁴⁾ gibt für diesen Ester an Sdp. 128°, spez. Gew. (13°) 0,8652.

Nach dem Abheben der Esterschicht wurden durch Kaliumcarbonat 15 g Isopropylalkohol ausgesalzen; er zeigte nach dem Trocknen über Calciumoxyd den Sdp. 735 mm 81—82° und d₁₉^{19°} 0,7890. *Atkins* und *Wallace*⁵⁾ geben an: Sdp. 760 mm 80,7—81,4° d₄^{11,8°} 0,80847. Dass kein n-Propylalkohol (Sdp. 760 mm 97,4°) vorliegt, ergibt sich aus dem p-Nitrobenzoat, das bei 110° schmilzt (*Buchner* und *Meisen-*

¹⁾ J. pr. [2] 37, 163 (1888).

²⁾ M. 10, 112 (1889).

³⁾ A. 200, 184 (1875).

⁴⁾ A. 153, 135 (1870).

⁵⁾ Soc. 103, 1471 (1913).

heimer¹⁾, Smp. 110°); n-Propyl-p-nitrobenzoat schmilzt bei 35°, *Fritsche & Co.*²⁾).

5,400; 3,970 mg Subst. gaben 0,3533; 0,2553 cm³ N₂ (13°, 715 mm)

C₁₀H₁₁O₄N Ber. N 6,70 Gef. N 7,35; 7,22%

Weiter konnten aus dem sauren Destillat 10 g Säure isoliert werden, die sich durch den Sdp._{735 mm} 159—161°, durch den Smp. — 5° bis — 3° und durch den Geruch als n-Buttersäure zu erkennen gaben.

Aus allen diesen Befunden geht hervor, dass Fraktion II ein Gemisch von Isopropyl-n-butytrat und Isopropyl-nitrat ist; das letztere siedet nach *Silva*³⁾ bei 101—102° und hat das spez. Gew. 1,036 bei 19°. Seine Gegenwart bedingt das gegenüber dem Isopropyl-n-butytrat erhöhte spez. Gewicht der Fraktion II; der nitrometrische Stickstoffgehalt deutet auf ein Mischungsverhältnis von 1 Isopropyl-nitrat auf 2,6 Isopropyl-n-butytrat, während dem gefundenen spez. Gewicht gerade umgekehrt ein Mischungsverhältnis von 3 Isopropyl-nitrat auf 1 Isopropyl-n-butytrat entsprechen würde. Vermutlich ist der Nitrometerwert zu niedrig, denn diese Bestimmungen geben ungenügende Resultate, sobald das organische Nitrat durch stickstofffreie organische Stoffe verdünnt ist.

7. Fraktion III.

Sdp._{750 mm} 114—130°; d_{20°}^{18°} 0,9218

0,2278 g Subst. gaben im Nitrometer 4,3 cm³ NO (20°, 745 mm)

Gef. N 1,1%

Es liegt hier wieder ein Gemisch von Isopropyl-n-butytrat und Isopropyl-nitrat vor, aber mit bedeutend weniger Isopropyl-nitrat als bei Fraktion II. Nach der Verseifung und Reduktion mit Zinkstaub und verdünnter Schwefelsäure isolierten wir (nach Verarbeitung der Hauptmenge von Fraktion III) 20 g unverseiften Ester, aus dem durch fraktionierte Destillation 18 g reines Isopropyl-n-butytrat vom Sdp._{750 mm} 127—128° und vom d_{20°}^{20°} 0,8567 gewonnen wurden.

8. Fraktion IV.

Sdp._{100 mm} 90—120°; d_{20°}^{18°} 1,0039

0,2320 g Subst. gaben im Nitrometer 24,2 cm³ NO (19°, 730 mm)

Gef. N 5,86%.

65 g der Fraktion IV wurden durch Kochen mit 120 g Zinkstaub und 310 g 60-proz. Schwefelsäure unter Rühren am Rückflusskühler reduzierend verseift, und lieferten bei der Destillation mit Wasserdampf 35 g Öl, das zur völligen Verseifung von etwa noch vorhandenen Buttersäure-estern noch 4 Stunden mit 2-n. NaOH gekocht, und dann mit gebranntem Kalk gründlich entwässert wurde. Es handelt sich

¹⁾ B. 38, 627 (1905).

²⁾ D. R. P. 213 459, Frdl. 9, 971.

³⁾ A. 154, 256 (1870).

um ein Gemisch von Hexylalkoholen, das in Fraktion IV teilweise als Nitrat, teilweise als n-Butyrat vorliegt. Aus den Verseifungslaugen lässt sich n-Buttersäure gewinnen; der Stickstoffgehalt deutet auf eine Mischung von 2 Teilen Hexyl-nitrat und 1 Teil Hexyl-butyrat, die 6,00% N enthalten würde, während reines Hexyl-nitrat 9,52% N verlangt.

Nun wurde untersucht, welche Hexylalkohole vorliegen. Das Alkoholgemisch lieferte folgende Fraktionen:


1) Sdp._{745 mm} 100—142°, 3 g; 2) 142—144°, 7 g; 3) 144—147°, 10 g; 4) 147—180°, 4 g; 5) 180—200°, 2 g.

Durch Kochen von 12 g der Fraktionen 2 und 3 mit 10 g Phtalsäureanhydrid und 10 g Benzol wurde der vorhandene primäre Alkohol als saurer Phtalsäure-ester gebunden¹⁾ und mit Sodalösung aufgenommen, während ein sekundärer Alkohol mit Äther extrahiert wurde.

Der saure Phtalsäure-ester wurde durch Kochen mit 2-n. NaOH verseift und lieferte 2 g Hexylalkohol, Sdp._{748 mm} 143—145°, d_{20}^{19} 0,8268.

4,722; 4,694 mg Subst. gaben 12,020; 11,945 mg CO₂ und 5,620; 5,640 mg H₂O
 $C_6H_{13} \cdot OH$ Ber. C 70,51 H 13,82%
 Gef. „ 69,42; 69,40 „ 13,32; 13,42%

Dem Siedepunkt und der Dichte nach liegt 2,3-Dimethylbutanol-(1) vor,




für welches *A. Gorski*²⁾ den Sdp._{761 mm} 144—145° und die Dichte $d_{40}^{20,5}$ 0,8297 angibt; ebenso stimmt darauf das Phenylurethan, Smp. 30°, aus Petroläther, für welches *Gorski* den Smp. 28—29° fand.


Der mit Phtalsäure-anhydrid in Benzollösung nicht reagierende Anteil (er war zweimal dieser Behandlung unterworfen worden) zeigte folgende Konstanten: Sdp._{748 mm} 137—139°; d_{20}^{18} 0,8239.

3,700; 3,900 mg Subst. gaben 9,495; 10,020 mg CO₂ und 4,340; 4,605 mg H₂O
 $C_6H_{13} \cdot OH$ Ber. C 70,51 H 13,82%
 Gef. „ 69,99; 70,07 „ 13,12; 13,21%

Es handelt sich demnach um Hexanol-(2):



für welches *Zelinsky* und *Przewalski*³⁾ angeben: Sdp._{732 mm} 138—139°; d_{40}^{20} 0,8287. Zur näheren Charakterisierung wurde das Hexanol-(2) durch Chromtrioxydlösung bei 60° zu Hexanon-(2)



¹⁾ Vgl. *F. W. Semmler* und *K. Bartelt*, B. **40**, 1365 (1907).

²⁾ *Ж.* **45**, 168 (1913).

³⁾ *Ж.* **40**, 1105 (1908).


oxydiert; Sdp._{750 mm} 126—128°. Nach *Wagner*¹⁾ liegt der Sdp._{755 mm} bei 127—127,5°. Das Semicarbazon schmolz nach dreimaligem Umkrystallisieren aus Alkohol bei 123°; *Kijner*²⁾ fand Smp. 122°.

4,315; 4,500 mg Subst. gaben 8,490; 8,880 mg CO₂ und 3,500; 3,710 mg H₂O
3,905; 3,405 mg Subst. gaben 0,9531; 0,8330 cm³ N₂ (14°, 695 mm)

C₇H₁₅ON₃ Ber. C 53,46 H 9,62 N 26,74%
Gef. „ 53,66; 53,82 „ 9,07; 9,22 „ 26,55; 26,61%

Die Fraktionen 2 und 3 des Alkoholgemisches bestehen also aus etwa 30% 2,3-Dimethyl-butanol-(1) und etwa 70% Hexanol-(2), die in der Fraktion IV des Rohöls teils als Nitrat, teils als Butyrat enthalten sind.

Die viel höher siedenden Fraktionen 4 und 5 des Alkoholgemisches gaben durch weiteres Destillieren schliesslich 1,5 g eines Öles vom Sdp._{740 mm} 194—196°, d₂₀^{19°} 0,8592, das mit einer gleichsiedenden Portion (0,5 g) aus Fraktion V vereinigt wurde. Nach den physikalischen Daten liegt ein Nonylalkohol vor, und zwar 2,4-Dimethyl-heptanol-(6), Sdp. 194—195° kor., d⁰ 0,8787, *M. Guerbet*³⁾:



doch stimmten die Analysen des sorgfältig von anderen Stoffen befreiten Präparats besser auf ein Octanol.

4,115; 3,820 mg Subst. gaben 11,165; 10,335 mg CO₂ und 5,115; 4,775 mg H₂O

C₈H₁₈O Ber. C 73,77 H 13,94%
C₉H₂₀O Ber. „ 74,92 „ 13,98%
Gef. „ 74,00; 73,79 „ 13,90; 13,91%

Die Frage kann erst entschieden werden, wenn mehr Substanz vorliegt.

9. Fraktion V.

Sdp._{12 mm} 93—105°; Hauptmenge Sdp._{13 mm} 96—97°; d₁₉^{19°} 1,2710

0,1086 g Subst. gaben 24,6 cm³ NO (16°, 752 mm)

Gef. N 13,23%

Der Stickstoffbestimmung nach könnte man vermuten, es handle sich um ein Hexylen-glykol-dinitrat, C₆H₁₂O₆N₂ mit 13,46% Stickstoff. Allein die Reduktion mit Eisen und Essigsäure ergab Propylen-glykol, Sdp._{11 mm} 85—85,5°, zähflüssiges farbloses Öl von süßem Geschmack.

5,385; 5,140 mg Subst. gaben 9,375; 8,975 mg CO₂ und 5,040; 4,870 mg H₂O

C₃H₈O₂ Ber. C 47,33 H 10,60%
Gef. „ 47,48; 47,62 „ 10,47; 10,60%

Es handelt sich um Propan-diol-(1,2), Sdp. 188—189°, Sdp._{21 mm} 96—98°, *U. Nef*⁴⁾, und nicht um Propan-diol-(1,3), Sdp. 214°, erstarrt im Kohlendioxydschnee-Äther-Gemisch. In der Fraktion V steckt das Propan-diol-(1,2)-dinitrat von *Henry*⁵⁾, dessen

¹⁾ J. pr. [2] **44**, 285 (1891).

²⁾ J. pr. [2] **64**, 115 (1901); vgl. *Michael*, Am. Soc. **41**, 416 (1919).

³⁾ C. r. **149**, 130 (1909).

⁴⁾ A. **335**, 203 (1904).

⁵⁾ Ann. chim. [4] **27**, 261 (1872).

Dichte bei 5° 1,335 beträgt; neben dem Dinitrat befindet sich noch das Nitrat des Octanols oder Nonanols, von dem am Schluss von Abschnitt 8, Fraktion IV, die Rede war. Ausserdem enthält Fraktion V auch Buttersäure-ester des Propan-diols-(1,2) oder des fraglichen Alkohols; darum liegen sowohl der Stickstoffgehalt ($C_3H_6O_6N_2$ Ber. N 16,87, Gef. 13,23 %) als das spez. Gewicht unter den berechneten Werten.


10. Fraktion VI.

Sdp. 6 mm 105—120°; d_{20}^{180} 1,2288
0,1498 g Subst. gaben 28,4 cm³ NO (18°, 747 mm)
Gef. N 10,94%

Nach der Reduktion und Verseifung mit Eisenpulver und Essigsäure (wobei man Verluste durch Verflüchtigung des Glykols mit Wasserdampf zu vermeiden hat) erhielten wir ein Hexen-glykol vom Sdp. 13 mm 120—123°, Sdp. 740 mm 217—222°, d_{20}^{190} 0,9798.

4,390; 4,025 mg Subst. gaben 9,570; 8,750 mg CO₂ und 4,685; 4,230 mg H₂O
 $C_6H_{14}O_2$ Ber. C 60,96 H 11,95%
Gef. „ 59,45; 59,29 „ 11,94; 11,76%

Von den verschiedenen Isomeren der Formel $C_6H_{14}O_2$ kommen dem Siedepunkt nach 2 in Frage, nämlich das Hexan-diol-(2,5) A und das 2-Methyl-pentan-diol-(2,5) B:



Um zu entscheiden, welches der beiden vorliegt, stellten wir Hexan-diol-(2,5) durch Reduktion von Acetonyl-aceton⁵⁾ nach *Duden* und *Lemme*⁶⁾ dar und verglichen es mit dem vorliegenden Glykol; es erwies sich aber als verschieden davon, namentlich durch seine viel geringere Viskosität, so dass die Durchflusszeit in einem einfachen Viskosimeter beim Hexan-diol-(2,5) 89,6 Sekunden, beim vorliegenden Diol aber nur 7,5 Sekunden beträgt. Demnach muss es sich um das 2-Methyl-pentan-diol-(2,5) (Formel B) handeln.

¹⁾ J. pr. [2] **23**, 18 (1881).

³⁾ C. r. **143**, 1221 (1906).

²⁾ B. **35**, 1335 (1902).

⁴⁾ M. **28**, 1006 (1907).

⁵⁾ Für die Darstellung von Acetonyl-aceton probierten wir, die Elektrosynthese des Diacet-bernsteinsäure-esters nach *S. P. Mulliken*, Am. **15**, 532 (1893), und *J. B. Weems*, Am. **16**, 583 (1894) durchzuführen, die in den organisch-elektrochemischen Lehrbüchern oft in einem besondern Kapitel als Schulbeispiel hervorgehoben wird, mussten aber feststellen, dass die präparative Darstellung des Esters so nicht gelingt; man kann nur durch die Fichtenspanreaktion seine Entstehung nachweisen.

⁶⁾ B. **35**, 1335 (1902).

Als primär-tertiäres Glykol reagiert es nur langsam mit Phenylisocyanat, lieferte aber doch einen Di-carbanilsäure-ester, weisses Krystallpulver aus Alkohol, Smp. 121,5°.

3,890; 4,525 mg Subst. gaben 9,630; 11,205 mg CO₂ und 2,380; 2,710 mg H₂O
 5,565; 4,710 mg Subst. gaben 0,3920; 0,3386 cm³ N₂ (13°, 711 mm)

C₂₀H₂₄O₄N₂ Ber. C 67,38 H 6,79 N 7,86%
 Gef. „ 67,52; 67,53 „ 6,84; 6,70 „ 7,87; 8,03%

Der zum Vergleich dargestellte Di-carbanilsäure-ester des Hexan-diol-(2,5) entsteht viel rascher und glatter und schmilzt nach dreimaligem Umkrystallisieren aus Alkohol bei 168°.

4,050; 4,100 mg Subst. gaben 9,975; 10,090 mg CO₂ und 2,515; 2,505 mg H₂O
 3,820; 3,900 mg Subst. gaben 0,2822; 0,2822 cm³ N₂ (14°, 704 mm)

C₂₀H₂₄O₄N₂ Ber. C 67,38 H 6,79 N 7,86%
 Gef. „ 67,17; 67,12 „ 6,95; 6,84 „ 8,14; 7,97%

11. Fraktion VII (Rückstand).

Nicht mehr unzersetzt destillierbar. d₂₀^{18°} 1,3321

0,1573 g Subst. gaben 22,8 cm³ NO (18°, 747 mm)

Gef. N 8,36%

25 g wurden mit Eisenpulver und Essigsäure reduziert und lieferten bei der Aufarbeitung neben etwa 3 g Methyl-pentan-diol-(2,5) 2 g einer Fraktion vom Sdp._{13 mm} 165—167°, die etwas Stickstoff enthielt und schwach alkalische Reaktion aufwies. Durch Fällung mit Mercurichloridlösung wurden die aminartigen Stoffe entfernt, worauf eine farblose dickliche Flüssigkeit vom Sdp._{10 mm} 165—167° überging, deren Aussehen und deren Reaktionen (süßer Geschmack; Bildung von Acrolein beim Erhitzen mit Kaliumbisulfat) auf Glycerin deutete. Die Elementaranalyse ergab etwas zu hohe Kohlenstoff- und Wasserstoffwerte, offenbar infolge der Gegenwart von wenig Hexan-diol; bessere Zahlen gab das mit Hilfe von Benzoylchlorid dargestellte Glycerin-tribenzoat, das nach viermaligem Umkrystallisieren aus Petroläther und aus Methylalkohol den Smp. 77° besass, vgl. *Lipp* und *Miller*¹⁾, 76°; *Labrouste*²⁾, 75,5—76,5°.

4,000; 4,400 mg Subst. gaben 10,545; 11,600 mg CO₂ und 1,905; 2,110 mg H₂O

C₂₄H₂₀O₆ Ber. C 71,26 H 4,99%
 Gef. „ 71,90; 71,90 „ 5,33; 5,37%

Es lässt sich auf Grund der vorhandenen Beobachtungen nicht erkennen, ob in der Fraktion VII unter anderem ein Glycerin-dinitrat vorgelegen hat, dessen Stickstoffgehalt allerdings rund doppelt so hoch wäre (Ber. N 15,47%) als der gefundene.

12. Überblick über die erhaltenen Verbindungen. Theoretisches.

Stellen wir sämtliche sicher nachgewiesenen Produkte, Kohlenwasserstoffe, Nitrate, Butyrate und Nitroverbindungen zusammen, so erhalten wir folgende Liste der durch Elektrolyse einer Mischung






¹⁾ J. pr. [2] 88, 373 (1913).

²⁾ C. r. 159, 306, Anm. 1 (1914).

von n-Butyrat und Nitrat bei Gegenwart von Kaliumbicarbonat erhaltenen Stoffe:

- a) α -Nitropropan, $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{NO}_2$;
- b) n-Hexan, $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$, entstanden durch *Kolbe*'sche Kohlenwasserstoffsynthese, unbeeinflusst durch die Gegenwart des Natriumnitrats;
- c) Isopropyl-nitrat, $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \\ \text{CH} \cdot \text{ONO}_2 \text{ (I)} \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{array}$;
- d) Isopropyl-butytrat, $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \diagup \\ \text{CH} \cdot \text{O} \cdot \text{CO} \cdot \text{C}_3\text{H}_7 \\ \diagdown \\ \text{CH}_3 \end{array}$;
- e) Hexanol-(2)-nitrat, $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH(O} \cdot \text{NO}_2\text{)—CH}_3$ (II), neben dem entsprechenden Butyrat;
- f) 2,3-Dimethyl-butanol-(1)-nitrat $\text{CH}_3\text{—CH—CH—CH}_2\text{—O} \cdot \text{NO}_2$ (III), neben dem entsprechenden Butyrat;
- g) Propan-diol-(1,2)-dinitrat $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{—CH—CH}_2 \text{ (IV),} \\ \text{ONO}_2 \quad \text{ONO}_2 \end{array}$ neben dem entsprechenden Butyrat;
- h) 2-Methyl-pentan-diol-(2,5)-dinitrat $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3\text{—C—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2 \cdot \text{ONO}_2 \text{ (V),} \\ | \\ \text{ONO}_2 \end{array}$ neben dem entsprechenden Butyrat;
- i) Glycerin in Form eines Nitrats, eines Nitrat-Butyrats, oder aus einem Nitro-propan-diol-dinitrat entstanden.

Wenn wir vom α -Nitro-propan, (dessen Bildung auf einen andern Reaktionsmechanismus zurückzuführen ist), vom n-Hexan (entstanden durch *Kolbe*'sche Kohlenwasserstoffsynthese), vom Glycerin und von den Buttersäure-estern (die den Salpetersäure-estern entsprechen) absehen, so lassen sich alle Verbindungen vom Propylen ableiten, etwa im Sinne folgender vorläufigen Schemata:



Die Produkte sind durchaus vergleichbar den bei der Propionat-Nitrat-Elektrolyse erhaltenen¹⁾ Äthyl-nitrat, Butyl-nitrat, Äthylen-glykol-dinitrat, Tetramethylen-glykol-dinitrat, aber ihre teilweise verzweigten Ketten verlangen gebieterisch die Annahme der Mitwirkung von Propylen, wie wir im Schema angedeutet haben.

Man kann daraus folgenden Schluss ziehen: nur solche Fettsäuren, deren Elektrolyse ungesättigte Kohlenwasserstoffe liefert, sind im Stande, ausser dem Nitrat des dem Säureradikal entsprechenden Alkyls, Dinitrate der entsprechenden Alkene, sowie Nitate der synthetischen Alkyle und Alkene von doppelter Kohlenstoffatomzahl zu bilden. Darum gibt die Elektrolyse von Nitrat-Acetat-Gemischen weder Alken-dinitrate noch synthetische Produkte.

Aus der Tatsache, dass Nitrat-Acetat-Gemische trotz der Äthansynthese kein Äthyl-nitrat liefern, und aus der weiteren Beobachtung, dass eines der Hexyl-nitrate sowie das Hexen-dinitrat aus der Butyrat-Nitrat-Elektrolyse sich nicht vom n-Hexan ableiten lässt, muss man folgern, dass die elektrochemische Synthese organischer Nitate von der Kolbe'schen Kohlenwasserstoffsynthese unabhängig ist. Damit wird es auch verständlich, dass *F. Fichter* und *Hans Buess*²⁾ bei der Einwirkung von Salpetersäure auf Di-propionyl-peroxyd keines der synthetischen Produkte, Butyl-nitrat oder Tetramethylen-glykol-dinitrat, erhalten haben. Als Arbeitshypothese für die im Gang befindlichen weiteren Versuche nehmen wir darum eine neue, unter dem Einfluss von Salpetersäure bzw. von Nitrationen zu beobachtende Elektrosynthese von höheren Alkyl-nitraten und Alken-dinitraten aus Alkenen an, im Sinne der obigen schematischen Formulierungen, wobei die Bildung der Glykol-dinitrate nur unter gleichzeitiger Sauerstoffzufuhr möglich ist.

Wir benützen gerne die Gelegenheit, um der *Gesellschaft für Chemische Industrie* in Basel, der *Chemischen Fabrik vorm. Sandoz* in Basel, Herrn Dr. *Alfred Pfister* in Englewood, N. J., U. S. A. und einem ungenannten Gönner in Riehen b. Basel für die reichen Geschenke, die uns die ungestörte Durchführung unserer wissenschaftlichen Untersuchungen trotz der Herabsetzung der vom Staate gewährten Beiträge ermöglichen, den wärmsten Dank auszusprechen.

¹⁾ Helv. **18**, 24 (1935).







²⁾ Helv. **18**, 549 (1935).

Elektrolysen von Mischungen von Isovalerianaten und Nitraten.

1. Einleitung.

Bei der Elektrolyse von Lösungen der Alkalisalze der Propionsäure und der Buttersäure mit Alkalinitraten erhielten wir überraschenderweise verschiedene synthetische Nitrates, wie z. B. Butylnitrat und Tetramethylen-glykol-dinitrat¹⁾ aus Propionat, sowie zwei Hexanol-nitrates und ein Hexen-glykol-dinitrat aus n-Butyrat, deren Entstehung nur verständlich wird, wenn man annimmt, dass die als Elektrolysenprodukt auftretenden Alkene mit Salpetersäure unter Zusammenlagerung, Esterbildung und Oxydation reagieren. Wir haben diese Versuche mit Isovalerianaten fortgesetzt und auch hier einige interessante synthetische Körper erhalten. Um ihre Bildung zu verstehen, ist es notwendig, auf die sorgfältigen Untersuchungen von J. Petersen²⁾ zurückzugreifen, der bei der Elektrolyse der Isovalerianate folgende Stoffe nachgewiesen hat:

- 1) Di-isobutyl = 2,5-Dimethyl-hexan I, als Produkt der Kolbe'schen Kohlenwasserstoff-synthese,
- 2) das Trimethyl-carbinol II,
- 3) das Isovalerianat des Trimethyl-carbinols III,
- 4) den Isobutyraldehyd IV,
- 5) das Isobutylen = Methyl-propen V,
- 6) das β -Butylen = Buten-(2) VI. Die Entstehung dieses Alkens sowohl als die des Trimethyl-carbinols sind nur unter Annahme von Umlagerungen³⁾ zu deuten; die Hofer- und Moest'sche Reaktion sollte aus Isovalerianat lediglich Isobutylalkohol VII und sein Entwässerungsprodukt Isobutylen V erzeugen.



2. Elektrolysen von Isovalerianat-Nitrat-Mischungen.

Wir verwendeten als Anodenflüssigkeit jeweils 150 cm³ einer Lösung von Natrium-isovalerianat und Natriumnitrat, die im Liter 408 g Isovaleriansäure (neutralisiert mit

¹⁾ Fr. Fichter, W. Siegrist und Hans Buess, *Helv.* **18**, 18 (1935).

²⁾ Z. physikal. Ch. **33**, 295 (1900).

³⁾ Vgl. W. Hückel, P. Ackermann, *J. pr.* [2] **136**, 15 (1933).

Natronlauge) und 170 g Natriumnitrat enthielt, und somit an Isovalerianat 4-n., an Nitrat 2-n. war. Die anodische Zelle steckte in einer zweiten, die eine Mischung aus Natriumcarbonat und Natriumnitrat (an beiden Salzen 2-n.) enthielt; im äusseren Raum befand sich eine kupferne Kühlschlange als Kathode in 230 cm³ einer 2-n. Natriumcarbonatlösung.

Die Anode, ein Platinblech von 30 cm² Oberfläche, wurde mit 4 Amp. belastet, was einer Stromdichte von 0,133 Amp./cm² entspricht.

Nach 32 Amp.-Stunden hatten sich ca. 35 cm³ Rohöl angesammelt; mit Hilfe von Äther entzogen wir dem Elektrolyten weitere 0,3 g. Es wurden 10 derartige Elektrolysen durchgeführt. Von der Verarbeitung des Rohöls berichtet Abschnitt 3.

Hier sei noch angeführt, dass durch Destillation des wässrigen, vom Rohöl befreiten Elektrolyten 1,8 cm³ tertiär-Butylalkohol = Trimethyl-carbinol II gewonnen wurden, die sich aus dem Destillat beim Sättigen mit Kaliumcarbonat ausschieden; Sdp._{740 mm} 81—83°, d_{20}^{20} 0,7847, in Übereinstimmung mit den Angaben von *S. Young* und *E. C. Fortey*¹⁾ und von *J. W. Brühl*²⁾; Carbanilsäure-ester, Smp. 132—133°, in Übereinstimmung mit *Knoevenagel*³⁾.

4,225; 4,405 mg Subst. gaben 10,670; 11,130 mg CO₂ und 3,085; 3,190 mg H₂O
5,160 mg Subst. gaben 0,3656 cm³ N₂ (14°, 700 mm)

C ₁₁ H ₁₅ O ₂ N	Ber. C 68,35	H 7,83	N 7,25%
	Gef. „ 68,87; 68,91	„ 8,17; 8,10	„ 7,76%

Damit ist der Befund *J. Petersen's* auch für die Mischelektrolyse mit Nitrat bestätigt.

Die vom tert. Butylalkohol befreite wässrige Lösung wurde mit starker Schwefelsäure versetzt und mit Wasserdampf destilliert. So erhielten wir Isovaleriansäure zurück, die der Hauptmenge nach (50 g) bei der richtigen Temperatur siedete; die allerersten Fraktionen zeigten bei der Titration zu niedrige Molekulargewichte (Sdp. 140—160°, Mol.-Gew. 82,0, 2 g; Sdp. 160—170°, Mol.-Gew. 93,9, 5 g), doch liess sich keine der niedrigen Homologen in reinem Zustand fassen.

3. Verarbeitung des Öles.

Das Rohöl enthielt nur wenig Nitrokörper, keine Aldehyde oder Ketone, war kaum explosiv und zersetzte sich bei einem Destillationsversuch erst oberhalb 130° unter Entwicklung roter Dämpfe. Es wurde an einer *Widmer*-Kolonnen fraktioniert, wobei durch Druckverminderung dafür gesorgt wurde, dass die Siedetemperatur nie 130° erreichte. Folgende Hauptanteile⁴⁾ wurden aus 300 g Rohöl nach viermaliger fraktionierter Destillation erhalten:

- | | |
|---|---|
| 1) Sdp. _{740 mm} 78—84°, 8 g; | 2) Sdp. _{100 mm} 47—51°, 81 g; |
| 3) Sdp. _{100 mm} 70—76°, 10 g; | 4) Sdp. _{100 mm} 80—90°, 9 g; |
| 5) Sdp. _{12 mm} 48—55°, 45 g; | 6) Sdp. _{12 mm} 70—76°, 69 g; |
| 7) Sdp. _{12 mm} 90—110°, 12 g; | 8) nicht mehr ohne Zersetzung
destillierbarer Rückstand, 40 g. |

Fraktion 1, d_{20}^{15} 0,7790, enthält keine Nitrate, sondern besteht aus einem Gemisch von 2,5-Dimethyl-hexan (I), Sdp. 108,5°, d_{15}^{15} 0,6993, *Clarke*⁵⁾, und Isobutylalkohol (VII), Sdp._{760 mm}

¹⁾ Soc. **81**, 717 (1902), Sdp._{760 mm} 82°, 55.

²⁾ A. **203**, 17 (1880), d_{40}^{20} 0,7864.

³⁾ A. **297**, 148 (1897), Smp. 136°, aus Äther.

⁴⁾ Die Zwischenläufe sind nicht berücksichtigt in der Tabelle.

⁵⁾ Am. Soc. **31**, 589 (1909).

107,19—107,48°, d_{25}^{25} 0,80014—0,80032, *R. F. Brunel*¹⁾. Der Carbanilsäure-ester aus unserem Präparat schmolz nach dem Umkrystallisieren aus Petroläther bei 84,5°; *W. Hückel* und *P. Ackermann*²⁾ geben als Smp. 86° an.

Fraktion 2, d_{20}^{18} 0,7035, enthält nur wenig Alkyl-nitrat und besteht vorwiegend aus dem 2,5-Dimethyl-hexan (I), das nach Reinigung durch Erhitzen mit konz. Schwefelsäure den Sdp. 107 bis 107,2° und das spezifische Gewicht d_{20}^{18} 0,6968 zeigte, in Übereinstimmung mit der oben angeführten Literaturstelle und mit den Messungen von *K. v. Auwers* und *F. Eisenlohr*³⁾, Sdp._{757 mm} 108,5 bis 109,5°, d_4^{17} 0,6978.

Fraktion 3, d_{20}^{18} 0,9610, enthält Nitrate und wurde darum mit Zinkstaub und Schwefelsäure reduziert, mit Wasserdampf destilliert, und dann noch zur Verseifung von Carbonsäure-estern mit Kaliumhydroxyd am Rückflusskühler gekocht. Bei erneuter Destillation mit Wasserdampf gingen mit den ersten Anteilen Alkohole über, die nach dem Trocknen mit gebranntem Kalk bei 97—105° siedeten und d_{20}^{19} 0,8047 aufwiesen. Der Carbanilsäure-ester schmolz zuerst bei 55°; beim Umkrystallisieren aus Petroläther stieg der Schmelzpunkt immer höher und erreichte zuletzt 85°. Diese Beobachtungen deuten auf ein Gemisch von Isobutylalkohol⁴⁾ (VII) und sekundären Butylalkohol = Butanol-(2) (VIII, siehe Formeltabelle am Schluss); für letzteren geben *W. Hückel* und *P. Ackermann*⁵⁾ an: Sdp._{740 mm} 98,5°; Carbanilsäure-ester, Smp. 64,5°; Eutektikum aus den Carbanilsäure-estern des Isobutylalkohols (1 Teil) und des sekundären Butylalkohols (3 Teile), Smp. 60°.

Der aus der kleinen stickstoffarmen Fraktion 4 durch reduzierende Verseifung erhaltene Alkohol war identisch mit dem aus Fraktion 5 gewonnenen und wurde darum mit jenem vereinigt.

Fraktion 5 ist Stickstoff-frei; sie besteht aus dem Isovaleriansäure-ester eines Butylalkohols. 40 g der Fraktion wurden durch 12-stündiges Kochen mit 120 cm³ 4-n. Kaliumhydroxyd verseift und lieferten bei der Destillation mit Wasserdampf ca. 20 g sekundären Butylalkohol, dessen Hauptmenge bei 94—97°⁶⁾ siedete und das spezifische Gewicht d_{20}^{19} 0,8059 aufwies; *Béhal*⁷⁾ gibt für die Dichte an d_4^{20} 0,819. Der Carbanilsäure-ester, aus Petroläther umkrystallisiert, schmolz bei 64° statt 64,5° (s. o.).

4,410; 4,430 mg Subst. gaben 11,095; 11,160 mg CO₂ und 3,120; 3,075 mg H₂O
4,200; 4,190 mg Subst. gaben 0,2920; 0,2847 cm³ N₂ (14°, 701 mm; 14°, 707 mm)

C ₁₁ H ₁₅ O ₂ N	Ber. C 68,35	H 7,83	N 7,25%
Gef. „	68,61; 68,71	„ 7,91; 7,77	„ 7,63; 7,52%

¹⁾ B. 44, 1004 (1911).

²⁾ J. pr. [2] 136, 23 ff. (1933).

³⁾ Z. physikal. Ch. 83, 430 (1913).

⁴⁾ Die Konstanten sind oben angeführt.

⁵⁾ J. pr. [2] 136, 23 ff. (1933).

⁶⁾ *W. Hückel, P. Ackermann*, loc. cit.

⁷⁾ Bl. [4] 25, 481 (1919).

Der sekundäre Butylalkohol wurde mit Chromsäurelösung oxydiert zum Butanon-2 = Methyl-äthyl-keton, dessen Sdp._{730 mm} 76—78° mit dem von *G. G. Henderson, J. A. R. Henderson* und *I. M. Heilbron*¹⁾ angegebenen Sdp._{760 mm} 79,3—79,5° übereinstimmt, während das Semicarbazon nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol bei 147° statt 148°²⁾ schmolz.

Durch Ansäuern gewannen wir aus der Verseifungsflüssigkeit Isovaleriansäure vom Sdp._{740 mm} 175—176°. Damit ist die Zusammensetzung von Fraktion 5 endgültig festgelegt; sie besteht aus sekundärem Butyl-isovalerianat (IX, Formeltabelle am Schluss) und ist isomer mit dem von *J. Petersen* bei der Elektrolyse von Alkali-isovalerianat ohne Nitratzusatz erhaltenen tertiären Butyl-isovalerianat (III). Inwiefern die Gegenwart von Nitrat die Bildung des sekundären Butylalkohols begünstigt, ist nicht durchsichtig.

Fraktion 6, d_{20}^{170} 0,9645.

0,1929 g Subst. gaben im Nitrometer 3,7 cm³ NO (18°, 745 mm)
Gef. N 1,1%

60 g wurden mit Zinkstaub und Schwefelsäure reduziert und verseift, wodurch schliesslich 30 g eines trockenen Alkoholgemisches erhalten wurden, das an der *Widmer*-Kolonnen folgende Fraktionen ergab:

1) Sdp._{743 mm} 120—140°, 1,5 g; 2) 140—162°, 2 g; 3) 164—166°, 24 g; 4) 166—176°, 1,5 g.

Der Hauptanteil zeigte d_{20}^{200} 0,8296 und war ein Octanol. Mit Phtalsäure-anhydrid in benzolischer Lösung reagierte dieses Octanol auch nach fünfstündigem Erwärmen nicht, also handelt es sich nicht um einen primären Alkohol. Dagegen wurde er bei 15-stündigem Erhitzen mit Phtalsäure-anhydrid ohne Lösungsmittel gebunden; aus dem sauren Phtalsäure-ester gewannen wir 11 g sekundäres Octanol vom Sdp._{730 mm} 164—165° und d_{20}^{200} 0,8267, von campherartigem Geruch. Das mit Cyansäuredampf erhaltene Allophanat schmolz bei 181°.

4,320; 4,645 mg Subst. gaben 11,765; 12,620 mg CO₂ und 5,510; 5,920 mg H₂O

C ₈ H ₁₈ O	Ber. C 73,77	H 13,94%
Gef. „	74,28; 74,10	„ 14,27; 14,26%

Durch Oxydation mit Dichromat und Schwefelsäure entstand ein Octanon vom Sdp._{730 mm} 153—155° und d_{20}^{190} 0,8209, dessen Semicarbazon, aus Methylalkohol umkrystallisiert, bei 117° schmolz.


4,495; 4,195 mg Subst. gaben 9,680; 9,010 mg CO₂ und 4,110; 3,880 mg H₂O
4,730; 3,910 mg Subst. gaben 0,9800; 0,8109 cm³ N₂ (17°, 711 mm; 16°, 710 mm)

C ₈ H ₁₆ ON ₃	Ber. C 58,32	H 10,34	N 22,70%
Gef. „	58,73; 58,58	„ 10,23; 10,35	„ 22,82; 22,88%

¹⁾ B. 47, 887 (1914).


²⁾ *R. Robinson*, Soc. 109, 1044 (1916).

Die physikalischen Konstanten des Alkohols, des Allophanats, des Ketons und des Semicarbazons passen am besten auf 3,4-Dimethyl-hexanol-(5) (X) und 3,4-Dimethyl-hexanon-(5) (XI)



Für den Alkohol gibt *J. Colonge*¹⁾ an: Sdp. 164—167°, d_{40}^{150} 0,840, campherartiger Geruch, Allophansäure-ester Smp. 182°; für das Keton fand derselbe Autor Sdp. 152—154°, d_4^{150} 0,833, Semicarbazon, aus Chloroform-Petroläther, Smp. 119°.

Die auf den ersten Blick befremdlich erscheinende Formel X erhält eine willkommene Stütze durch eine neue Beobachtung von *N. L. Drake* und *F. P. Veitch*²⁾, die beim Erwärmen von Butanol-(2) (an Stelle von Buten-(2) angewandt) mit 75-proz. Schwefelsäure auf 80° während 48 Stunden 3,4-Dimethyl-hexen-(2) (Xa) erhielten:



Damit ist bewiesen, dass auch unser Octanol aus Buten-(2) stammt.

Ein kleiner, mit Phtalsäure-anhydrid überhaupt nicht reagierender Anteil von Fraktion 6, Sdp._{730 mm} 162—163°, d_{20}^{190} 0,8468, war vermutlich tertiär-Butyl-isovalerianat (III), das als schwer verseifbarer Ester alle Behandlungen überstanden hatte.

$\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}_2$	Ber. C 68,29	H 11,47%
	Gef. „ 69,53; 69,54	„ 11,84; 11,92%

Fraktion 7, d_{20}^{220} 1,0531

0,1053 g Subst. gaben im Nitrometer 7,0 cm³ NO (20°, 729 mm)
Gef. N 3,7%

Nach Reduktion und Verseifung gewannen wir 2 g Octanol vom Sdp. 164—166°, vgl. Fraktion 6, und 2 g eines Glykolgemisches, das mit dem aus dem Rückstand gewonnenen vereinigt wurde.

Rückstand, nicht ohne Zersetzung destillierbar, d_{20}^{220} 1,1573:

0,1175 g Subst. gaben im Nitrometer 13,0 cm³ NO (20°, 729 mm)
Gef. N 6,2%

Das hohe spezifische Gewicht und der vergleichsweise hohe Stickstoffgehalt deuteten darauf hin, dass in dieser Fraktion Glykoldinitrate steckten. Wir haben übrigens bei allen Fraktionen nach der nitrometrischen Methode zu geringe Stickstoffgehalte gefunden (ein Buten-glykol-dinitrat enthält der Formel $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_6\text{N}_2$ nach 15,56% N), weil offenbar etwas längere Kohlenwasserstoffketten die nitrometrische Reaktion wie ein Verdünnungsmittel lähmen. Trotzdem ist diese Analysenmethode zur vorläufigen Charakterisierung der Fraktionen bequem.

¹⁾ Bl. [4] 49, 445, 444 (1931).

²⁾ Am. Soc. 57, 2623 (1935).

39 g Öl wurden mit Eisen und Essigsäure reduziert und lieferten schliesslich 10 g eines Glykolgemisches vom Sdp. $_{11\text{ mm}}$ 80—150°, das mit dem entsprechenden Anteil von Fraktion 7 vereinigt nach nochmaliger Destillation folgendes Bild ergab:

- 1) Sdp. $_{12\text{ mm}}$ 85—110°, 3,8 g; 2) Sdp. $_{12\text{ mm}}$ 120—140°, 3,7 g;
3) Sdp. $_{12\text{ mm}}$ 140—155°, 2,9 g.

Eine erneute Destillation verengerte die Siedepunktsgrenzen, verringerte aber auch die Mengen der 3 Fraktionen:

- A. Sdp. $_{12\text{ mm}}$ 86—88°; Sdp. $_{738\text{ mm}}$ 181—183°; 2,0 g
B. Sdp. $_{12\text{ mm}}$ 124—128°; Sdp. $_{740\text{ mm}}$ 205—210°; 1,7 g
C. Sdp. $_{12\text{ mm}}$ 145—153°; Sdp. $_{740\text{ mm}}$ 247—255°; 0,8 g

A. 4,195; 4,880 mg Subst. gaben 8,470; 9,835 mg CO₂ und 4,290; 5,010 mg H₂O
C₄H₁₀O₂ Ber. C 53,29 H 11,19%
Gef. „ 55,06; 54,91 „ 11,44; 11,45%

Die Analyse ergibt, allerdings nicht genau¹⁾, die Zusammensetzung eines Butan-diols; dass es sich tatsächlich um ein solches handelt, beweist der mit Phenylisocyanat erhaltene Di-carbanilsäure-ester, Smp. 185° nach dem Umkrystallisieren aus Benzol.

3,890; 4,280 mg Subst. gaben 9,475; 10,425 mg CO₂ und 2,230; 2,500 mg H₂O
6,420; 5,920 mg Subst. gaben 0,5106; 0,4729 cm³ N₂ (15°, 700 mm)
C₁₈H₂₀O₄N₂ Ber. C 65,82 H 6,14 N 8,54%
Gef. „ 66,43; 66,43 „ 6,41; 6,53 „ 8,68; 8,72%

Der Siedepunkt des Glykols, seine Löslichkeit in Wasser und Äther und der Smp. seines Di-carbanilsäure-esters deuten auf Butan-diol-(2,3) (XII), das nach *Ciamician* und *Silber*²⁾ unter gewöhnlichem Druck bei 180—184°, unter 11 mm Druck bei 83° siedet, und dessen inaktiver Di-carbanilsäure-ester nach denselben Autoren bei 175° schmilzt, während das racemische Isomere den Smp. 201 bis 202° aufweist; *Neuberg* und *Kobel*³⁾ fanden für die *l*-Form den Smp. 201°. Jeder Zweifel über die Natur unseres Glykols wurde behoben durch die Behandlung mit Bromwasser am Licht (der Quecksilber-Quarzlampe), wobei — ebenfalls nach *Ciamician* und *Silber* — Butan-dion-(2,3) = Diacetyl (XIII) entstand, dessen mit Hydroxylamin-chlorhydrat und Natriumcarbonat erhaltenes Dioxim nach dem Umkrystallisieren aus verdünntem Alkohol bei 234,5° schmolz, übereinstimmend mit den Angaben von *R. Fittig*, *C. Daimler* und *H. Keller*⁴⁾; *H. Biltz*⁵⁾ fand für ein sublimiertes Präparat den Smp. 245—246°. Unser Dioxim gab mit Nickeltetraminsalzlösung augenblicklich den scharlachroten inneren Komplex.

¹⁾ Wegen Beimengung von etwas Octanol.

²⁾ B. **44**, 1284 (1911).

³⁾ Bioch. Z. **160**, 250 (1925).

⁴⁾ A. **249**, 204 (1888).

⁵⁾ B. **41**, 1882 (1908).

4,565; 4,795 mg Subst. gaben 6,915; 7,300 mg CO₂ und 2,780; 2,915 mg H₂O
4,370; 4,625 mg Subst. gaben 0,9555; 1,0192 cm³ N₂ (15°, 703 mm; 16°, 703 mm)

C₄H₈O₂N₂ Ber. C 41,35 H 6,94 N 24,14%
Gef. „ 41,31; 41,62 „ 6,81; 6,80 „ 23,97; 24,08%

XII CH₃—CH(OH)—CH(OH)—CH₃ XIII CH₃—CO—CO—CH₃

B. Die Elementaranalyse ergab 60,3% C und 11,2% H, was eher für ein Hexan-diol (Ber. 60,96% C, 11,95% H) als für ein Butan-diol (Ber. 53,29% C, 11,19% H) sprechen würde; allein mit Phenyl-isocyanat entstand ein Butan-diol-di-carbanilsäure-ester, vom Smp. 120,5°, aus Benzol.

4,505; 4,165 mg Subst. gaben 10,915; 10,115 mg CO₂ und 2,480; 2,275 mg H₂O
5,915; 5,515 mg Subst. gaben 0,4777; 0,4483 cm³ N₂ (14°, 699 mm; 15°, 700 mm)

C₁₈H₂₀O₄N₂ Ber. C 65,82 H 6,14 N 8,54%
Gef. „ 66,08; 66,23 „ 6,16; 6,11 „ 8,83; 8,87%

Der Siedepunkt des Diols und der Schmelzpunkt des Di-carbanilsäure-esters lassen die Wahl zwischen zwei Isomeren: Butan-diol-(1,2) (XIV) siedet nach A. Kling¹⁾ bei 192—194°, und von seinem Di-carbanil-säure-ester geben Levene und Mitarbeiter²⁾ als Schmelzpunkte an 121—123° für das *l*-Isomere und 125—127° resp. 124—125° für das *d*-Isomere; Butan-diol-(1,3) (XV) siedet nach A. Wurtz³⁾ bei 207—208° und sein Di-carbanilsäure-ester schmilzt nach Walpole⁴⁾ bei 122—123°, während Levene und Mitarbeiter²⁾ für die optischen Antipoden die Schmelzpunkte 127—128° (*l*) und 122—123° (*d*) angeben.

XIV CH₃—CH₂—CH(OH)—CH₂(OH) XV CH₃—CH(OH)—CH₂—CH₂(OH)

Zur Entscheidung stellten wir das auf Grund der physikalischen Daten eher in Frage kommende Butan-diol-(1,3)⁵⁾ dar und verglichen seinen Di-carbanilsäure-ester, Smp. 121°, mit unserem Präparat: der Mischschmelzpunkt lag bei 120—121°, zeigte also keine Erniedrigung, womit Formel XV (die auf den ersten Blick befremdlich erscheint) bewiesen ist.

C. Die Elementaranalyse dieser wegen ihrer kleinen Menge nicht völlig einheitlich zu erhaltenden Fraktion lieferte Zahlen, die zwischen den für ein Butan-diol und den für ein Butan-triol berechneten Werten lagen; ein mit Phenylisocyanat dargestellter Abkömmling vom Smp. 131° liess, obschon einheitlich aussehend, bei der Elementaranalyse auch keine klare Entscheidung fällen, indem die gefundenen Werte sowohl auf einen Butan-triol-di-carbanilsäure-ester als auf einen Butan-triol-tri-carbanilsäure-ester schliessen lassen.

¹⁾ C. r. **140**, 314, 1345 (1905).

²⁾ J. Biol. Chem. **74**, 343 (1927); **87**, 375 (1930).

³⁾ Bl. [2] **41**, 362 (1884).

⁴⁾ Proc. Roy. Soc. London [B] **83**, 272 (1911).

⁵⁾ In einem Punkt weichen unsere Beobachtungen von den Literaturangaben ab; Kekulé, A. **162**, 310 (1872), sagt, das Diol sei in Äther unlöslich, während unser Präparat sowohl als das durch elektrochemische Reduktion von Aldol dargestellte Butan-diol-(1,3) sich allerdings mit Äther nur schwer mischen, aber beim Umrühren glatt auflösen.

5,111; 5,089 mg Subst. gaben 11,985; 11,935 mg CO₂ und 2,680; 2,610 mg H₂O
 5,516; 4,443 mg Subst. gaben 0,405; 0,321 cm³ N₂ (26,5° 755 mm; 25°, 755 mm)

C ₁₈ H ₂₀ O ₅ N ₂	Ber. C 62,76	H 5,84	N 8,14%
	Gef. „ 63,95; 63,96	„ 5,86; 5,94	„ 8,38; 8,25%
C ₂₅ H ₂₅ O ₆ N ₃	Ber. „ 64,76	„ 5,44	„ 9,07%

Angesichts des hohen Siedepunktes der Fraktion C halten wir das Vorliegen eines Butan-triols für wahrscheinlich; es würde dem Glycerin entsprechen, das wir bei der Butyrat-Nitrat-Elektrolyse¹⁾ erhielten.

4. Überblick über die erhaltenen Verbindungen; Theoretisches.

Auch am Beispiel der Isovalerianate, wie bei den Butyraten und Propionaten, haben wir gefunden, dass die Elektrolyse bei Gegenwart von Nitraten zur Bildung synthetischer Alkyl-nitrate und Alken-dinitrate führt. Die Ausbeute an Nitraten tritt bei der Isovaleriansäure zurück im Vergleich zur Ausbeute an Stickstofffreien Körpern, wenn man das Ergebnis den Elektrolysen von Propionat-Nitrat-Gemischen und von Butyrat-Nitrat-Gemischen gegenüberstellt. Eine Zusammenstellung sämtlicher sicher nachgewiesener Produkte gibt Tabelle I, wobei wir die von *J. Petersen* nachgewiesenen ungesättigten Kohlenwasserstoffe als Zwischenstufen einfügen, da nach allen Beobachtungen der Weg über diese Alkene führt, unabhängig von der gleichzeitig verlaufenden *Kolbe*'schen Synthese.

An Stelle der Alkohole entstehen in Wirklichkeit bei der Elektrolyse Nitrate oder Isovalerianate; die ersteren haben wir nicht als solche gefasst, denn die saubere Trennung der zahlreichen Stoffe durch fraktionierte Destillation erwies sich, wenn man nicht in viel grösserem Maßstab arbeiten wollte, als undurchführbar; wir haben darum die Nitrate durch reduzierende Verseifung in Alkohole und Glykole übergeführt.

Überraschend ist am vorliegenden Beispiel die Beweglichkeit und Wendigkeit der Butene²⁾; die Bildung des 2-Butens aus Isovalerianaten bei der Elektrolyse nach *J. Petersen* ohne Nitratzusatz unter Streckung der Kohlenstoffkette ist ein schlagendes Beispiel dafür. Ebenso unerwartet ist die Struktur unseres Octanols, des einzigen durch neue Kohlenstoffbindung entstandenen Stoffes.

Bei den Glykolen beschränkt sich die Reaktion auf die C₄-Reihe; ein C₈-Glykol, entsprechend dem Tetramethylen-glykol bei der Propionat-Nitrat-Elektrolyse oder dem Hexen-glykol bei der Butyrat-Nitrat-Elektrolyse, haben wir nicht gefunden.


Sieht man sich nach einer Erklärung der Ergebnisse der Mischelektrolysen von fettsauren Salzen mit Nitraten um, so bietet

¹⁾ *Fr. Fichter* und *F. Metz*, *Helv.* **18**, 597 (1936).

²⁾ Vgl. auch *W. Hückel* und *P. Ackermann*, *J. pr.* [2] **136**, 23 (1933).

Tabelle I.

Kolbe'sche Elektrolyse



VII



III



IX



X



XII



XV




XVI

sich als mögliche Annahme¹⁾ die Aktivierung der Alkene bei ihrer Entstehung an der Anode. Wenn diese Annahme zuträfe, so müsste man aber erwarten, dass die aktivierten Alkene auch mit andern Säuren, nicht nur mit Salpetersäure reagieren; wir haben viele Versuche mit Sulfaten, mit Chloriden usw. angestellt, über die gelegentlich berichtet werden soll, aber bis jetzt keine analogen Synthesen erzielen können. Ferner ist zu bedenken, dass rein formelmässig zwar die Bildung eines synthetischen Alkylnitrats aus Alken und Salpetersäure ohne weiteres sich vollziehen kann:



dass aber die Entstehung eines synthetischen Glykol-dinitrats aus Alken und Salpetersäure die Mithilfe eines Oxydationsmittels voraussetzt:



Ist dafür die Anode verantwortlich? Dann müssten auf demselben Weg auch synthetische Glykol-sulfate darstellbar sein, was uns bisher nicht gelingen wollte.

Zugunsten der Hypothese von der Aktivierung der Alkene können wir allerdings anführen, dass unsere bisherigen Versuche der chemischen Nachahmung mit Di-acyl-peroxyd und Salpetersäure²⁾ oder mit Propionaten und Persalpetersäure³⁾ keine synthetischen Glykol-dinitrate ergeben haben.

Ein schon bei anderer Gelegenheit geäußelter und durch zahlreiche Beispiele belegter Gedanke⁴⁾, dass an der Anode sich Reaktionen rasch vollziehen, die sonst nur im wasserfreien Medium, bei höherer Temperatur und langsam verlaufen, ist vielleicht auch für die Mischelektrolysen mit Nitraten anwendbar; die Synthese des Octanols (X) und ihr Parallelismus mit der Synthese des 3,4-Dimethyl-hexen-(2) (Xa)⁵⁾ stützt diese Anschauung, der allerdings eine innerliche Verwandtschaft mit der Hypothese von der Aktivierung nicht abzusprechen ist.

1) Diskussionsbemerkung von Prof. Dr. T. Reichstein beim Vortrag von F. Metz in Lausanne, vor der Schweiz. chem. Gesellschaft am 29. II. 1936.

2) Fr. Fichter und Hans Buess, *Helv.* **18**, 549 (1935).

3) Unveröffentlichte Versuche von P. Sutter.

4) *Helv.* **13**, 89 (1930).

5) Durch langes Erhitzen von Buten-(2) mit 75-proz. Schwefelsäure auf 80°.

Curriculum vitae.

Ich, *Fritz Metz* von Basel, wurde als Sohn des Ludwig Metz, Fabrikportier, und seiner Gattin Berta, geb. Luger, am 5. Februar 1912 in Basel geboren. Ich absolvierte hier die Primarschule, das Untere Gymnasium und die erste Klasse der Oberen Realschule. Im April 1927 trat ich in die Chemische Fabrik J. R. Geigy A.G. ein, wo ich 3 Jahre im analytischen Labor als Laborant ttig war. Nebenher besuchte ich vom Oktober 1927 bis Mrz 1930 den Abendkurs des Instituts Minerva und erwarb im April 1930 das Maturittszeugnis. Darauf begann ich meine Chemiestudien an der Anstalt fr Anorganische Chemie unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Fr. Fichter und bestand Ende Juni 1932 das Vorexamen in anorganischer und analytischer Chemie. Vom Wintersemester 1932/33 bis Ende Wintersemester 1933/34 arbeitete ich auf dem Gebiet der organischen Chemie bei Herrn Prof. Dr. H. Rupe und legte im Februar 1934 das Vorexamen in organischer Chemie ab. Anschliessend begann ich unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Fr. Fichter die vorliegende Arbeit, die im Mrz 1936 in seinem Privatlaboratorium ihren Abschluss fand.

Im Wintersemester 1931/32 und im Sommersemester 1932 war ich Assistent in den Vorlesungen ber anorganische Experimentalchemie, analytische Chemie und Chemie der seltenen Elemente. Seit dem 1. April 1935 bin ich Unterrichtsassistent der Anstalt fr Anorganische Chemie, nachdem ich schon in den beiden vorhergehenden Semestern als Hilfsassistent ttig war.

Meine Teilexamina in Botanik (Mai 1933), in Experimentalphysik (November 1934) und in physikalischer Chemie (April 1935) bestand ich bei den Herren Professoren G. Senn, A. Hagenbach und A. L. Bernoulli.

Whrend meiner Studienzeit besuchte ich die Vorlesungen und Praktika folgender Herren Professoren und Dozenten: A. L. Bernoulli, P. Buchner, H. Erlenmeyer, Fr. Fichter, H. O. L. Fischer, H. Geiger, A. Hagenbach, P. Ruggli, H. Rupe, G. Senn, W. Vischer und M. Wehrli.

Allen diesen Herren danke ich bestens fr ihre Bemhungen. Ganz besonders aber mchte ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Fr. Fichter, fr seine wertvollen Ratschlge und Anregungen, sowie fr sein mir bewiesenes Wohlwollen und Vertrauen meinen herzlichsten Dank aussprechen.

